

Checkliste der Weberschnecken Mittel- und Nordeuropas
Checklist of the harvestmen of Central and Northern Europe
(Arachnida: Opiliones).
Version 27. Dezember 2004.

(ein Service der "Arachnologischen Gesellschaft e.V.")
(a service of the "Arachnological Society")

Theo BLICK & Christian KOMPOSCH

(wir bitten um Mitteilung von Änderungen, Ergänzungen oder Verbesserungsvorschlägen)
(please inform us about corrections, additions or improvements)

Zitierung/citation:

Blick, T. & C. Komposch (2004): Checkliste der Weberschnecken Mittel- und Nordeuropas. Checklist of the harvestmen of Central and Northern Europe. (Arachnida: Opiliones). Version 27. Dezember 2004. - Internet:
http://www.AraGes.de/checklist.html#2004_Opiliones

Einführung/introduction

Folgende zusammenfassenden Publikationen liegen dieser Liste zugrunde (mit Angabe der Kürzel für die Checkliste):

This list is based on the following comprehensive papers (with abbreviations used in the checklist):

Belgien/Belgium/BE	vhe	Vanhercke (1999)
Niederlande/Netherlands/NL	spo	Spoek (1975)
Dänemark/Denmark/DK	sto	Stol (1993, 2002), siehe auch/see also: Skipper (2003) ; [ohne Färöer Inseln/except the Faroe Isles]
Norwegen/Norway/NO	sto	Stol (1993, 2002)
Schweden/Sweden/SE	sto	Stol (1993, 2002)
Finnland/Finland/FI	sto	Stol (1993, 2002), s. auch/see also: Heinäjoki (1944)
Deutschland/Germany/DE	blm	Bliss & Martens (1995)
Schweiz/Switzerland/CH	mar	Martens (1978)
Österreich/Austria/AT	kog	Komposch & Gruber (2004)
Tschechische Republik/Czech Republic/CZ	kli	Klimeš (2000)
Ungarn/Hungaria/HU	kom	Komposch (2004)
Slowakei/Slovakia/SK	kli	Klimeš (2000)
Polen/Poland/PL	sta	Starega (2000)
Slowenien/Slovenia/SI	nog	Novak & Gruber (2000)
N (= neu/new)		in anderen Arbeiten publizierte Nachweise (mit konkreten Zitaten)/records published in other papers (cited in detail).

Benennung der Arten nach Martens (1978), mit Aktualisierungen; Familienzuordnung nach [Kury \(2003\)](#).

Hinweise:

Die Familienzuordnung und -benennung unterscheidet sich gegenüber Martens (1978) in zwei Punkten:

- Cladonychiidae = Erebomastriidae (Cokendolpher 1985)
 - Von den Phalangiidae (sensu Martens 1978) sind nun die Sclerosomatidae abgetrennt (vgl. Crawford 1992, Starega 2000, Kury 2003). Die Zusammenghörigkeit der Gattungen dieser abgetrennten Familie ist weniger fraglich als die Monophylie der in den Phalangiidae verbleibenden Gattungen. Wir haben uns aber dennoch für diese Lösung entschieden und hoffen damit die Diskussion anzuregen und zu notwendigen Revisionsarbeiten zu motivieren.
- Zahlreiche Arten der Gattung *Trogulus* sind dringend revisionsbedürftig (Martens in litt., Komposch, Novak, Schönhofen unpubl.).

Species nomenclature after Martens (1978), with recent changes; familial affiliation after [Kury \(2003\)](#).

Remarks:

- The familial affiliations and names of the families differ from Martens (1978) in two cases:

- Cladonychiidae = Erebomastriidae (Cokendolpher 1985)
- The Sclerosomatidae are now separated from the Phalangiidae (s. lat., see Martens 1978) (compare Crawford 1992, Starega 2000, Kury 2003). The relationship of the genera of the Sclerosomatids is much less questionable than the monophly of the remaining Phalangiid genera. We decided to use the presented solution and hope to motivate the discussion and necessary revisions.

- Numerous species of the genus *Trogulus* need a revision (Martens in litt., Komposch, Novak, Schönhofer unpubl.).


Familiensummen/totals of families

family	total	BE	NL	DK	NO	SE	FI	PL	DE	CH	AT	CZ	SK	HU	SI
Sironidae	2							1			1		1		1
Travuniidae	1									1					
Cladonychiidae	2								1		1		1	1	1
Nemastomatidae	17	5	5	2	3	2	1	5	8	6	12	5	5	6	10
Dicranolasmatidae	1										1		1	1	1
Trogulidae	10	3	3	1	1	1		2	6	8	8	2	2	3	6
Ischyropsalitidae	7		1					2	2	2	5	2	1	1	4
Phalangiidae	35	16	14	12	10	12	9	17	22	22	22	15	16	15	24
Sclerosomatidae	19	3	4	4	3	5	2	9	10	10	11	9	5	6	11
number of (sub)species	94	27	27	19	17	20	12	36	49	49	61	33	32	33	58
number of families	9	4	5	4	4	4	3	6	6	6	8	5	8	7	8

Auswertung der Erstbeschreibungsjahre der 94 Webergnechtarten aus den 14 beteiligten Ländern Evaluation of the years of the first description for the 94 harvestmen species from the 14 participating countries

Abb. 1: Erstbeschreibungsjahre der 94 Webergnechtarten, aufgeteilt in 25-Jahres-Abschnitte (unter den Zeitabschnitten sind jeweils die Artensummen angegeben)

Fig. 1: Years of the first description for the 94 harvestmen species divided into 25 year sections (the totals for each quarter-century are given in a table below the figure)



Kurze Diskussion zu Abb. 1:

- bis 1899 wurden 2/3 (63 spp.) aller bekannten Webergnechtarten der hier behandelten 14 Länder beschrieben
- seit 1875 ist – mit der Ausnahme des Zeitraumes 1950-1974 (u.a. durch Jürgen Gruber und Jochen Martens) – ein stetiger Rückgang der Neubeschreibungen zu verzeichnen
- die Abbildung lässt vermuten, dass in Mitteleuropa nur noch wenige unbeschriebene Arten zu erwarten sind

Short discussion of Fig. 1:

- until 1899 two thirds (63 spp.) of known harvestman species from these 14 countries were described
- since 1875 a permanent decline in the number of descriptions is registered – with exception of the period 1950-1974 (for example by Jürgen Gruber and Jochen Martens)
- the graphic shows that there may only be a few undescribed species left in central and northern Europe

Checkliste/checklist

taxon	author	BE	NL	DK	NO	SE	FI	PL	DE	CH	AT	CZ	SK	HU	SI	synonymies, reference, notes
Sironidae																
<i>Siro carpaticus</i>	Rafalski, 1956							sta					kli			
<i>Siro duricorius</i>	(Joseph, 1868)									kog				nog		
Travuniidae										mar						
<i>Peltonychia leprieuri</i>	(Lucas, 1860)															
Cladonychiidae																
<i>Holoscotolemon jaqueti</i>	(Corti, 1905)												kli	kom		
<i>Holoscotolemon unicolor</i>	Roewer, 1915								blm	kog				nog		
Nemastomatidae																
<i>Carinostoma carinatum</i>	(Roewer, 1914)									kog				nog		
<i>Carinostoma elegans</i>	(Sørensen, 1894)												kom			
<i>Histicostoma dentipalpe</i>	(Ausserer, 1867)								blm	mar	kog			nog		
<i>Mitostoma alpinum</i>	(Hadži, 1931)									kog				nog		
<i>Mitostoma chrysomelas</i>	(Hermann, 1804)	vhe	spo	sto	N	sto		sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	NO: Olsen (2000)
<i>Nemastoma bidentatum</i> <i>bidentatum</i>	Roewer, 1914									kog				nog	SI: also <i>N. bid. bidentatum x sparsum</i> (Martens 1978)	
<i>Nemastoma bidentatum</i> <i>relictum</i>	Gruber & Martens, 1968									kog						
<i>Nemastoma bidentatum</i> <i>sparsum</i>	Gruber & Martens, 1968									kog						SI: see <i>N. bid. bidentatum</i>
<i>Nemastoma bimaculatum</i>	(Fabricius, 1775)	vhe	N		sto				blm							NL: Wijnhoven & Koomen (1997)
<i>Nemastoma dentigerum</i>	Canestrini, 1873		spo						blm	mar				nog		
<i>Nemastoma lugubre</i>	(Müller, 1776)	vhe	spo	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom			
<i>Nemastoma schuelleri</i>	Gruber & Martens, 1968									kog						
<i>Nemastoma triste</i>	(C.L. Koch, 1835)	N						sta	blm		kog	kli		nog	BE: Martens (1978)	
<i>Paranemastoma bicuspisatum</i>	(C.L. Koch, 1835)								blm	mar	kog			nog		
<i>Paranemastoma kochi</i>	(Nowicki, 1870)							sta				kli	kli			
<i>Paranemastoma quadripunctatum</i>	(Perty, 1833)	vhe	spo					sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	<i>Nemastoma q.</i>
<i>Paranemastoma sillii</i>	(Herman, 1871)													kom		
Dicranolasmatidae																
<i>Dicranolasma scabrum</i>	(Herbst, 1799)										kog		kli	kom	nog	
Trogulidae																
<i>Anelasmoecephalus cambridgei</i>	(Westwood, 1874)	vhe	spo						blm	mar	kog					
<i>Anelasmoecephalus hadzii</i>	Martens, 1978								mar	kog				nog		
<i>Anelasmoecephalus rufitarsis</i>	Simon, 1879									N						CH: Martens & Chemini (1988)
<i>Trogulus cisalpinus</i>	Chemini & Martens, 1988									N	kog					CH: Cotti (1989)
<i>Trogulus closanicus</i>	Avram, 1971								blm	N	kog			nog	CH: Weiβ et al. (1998)	
<i>Trogulus falcipennis</i>	Komposch, 2000										kog			nog		
<i>Trogulus martensi</i>	Chemini, 1983									N	N					DE: Malten (1999), Spelda et al. (2003); CH: Weiβ et al. (1998)
<i>Trogulus nepaeformis</i>	(Scopoli, 1763)	vhe	N					sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	frequently used sensu lato - see <i>T. closanicus</i> and <i>T. martensi</i> ; NL: Wijnhoven (1998)
<i>Trogulus tingiformis</i>	(C.L. Koch, 1847)								blm		kog			kom	nog	1848 (see Brignoli 1985)
<i>Trogulus tricarinatus</i>	(Linnaeus, 1767)	vhe	spo	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	sensu lato; 1758 (lapsus)	
Ischyropsalididae																
<i>Ischyropsalis carli</i>	Lessert, 1905								blm	mar	kog					
<i>Ischyropsalis hadzii</i>	Roewer, 1950										kog			nog		
<i>Ischyropsalis hellwigi</i> <i>hellwigi</i>	(Panzer, 1794)		spo					sta	blm		kog	kli		kom	nog	<i>hellwigii</i>
<i>Ischyropsalis helvetica</i>	Roewer, 1916									mar	kog					
<i>Ischyropsalis kollari</i>	C.L. Koch, 1839										kog			nog		
<i>Ischyropsalis manicata</i>	L. Koch, 1865								sta			kli	kli			
<i>Ischyropsalis muellneri</i>	Hamann, 1898														nog	

taxon	author	BE	NL	DK	NO	SE	FI	PL	DE	CH	AT	CZ	SK	HU	SI	synonyms, reference, notes
Phalangiidae																
<i>Amilenus aurantiacus</i>	(Simon, 1881)	vhe							blm	mar	kog				nog	
<i>Dasylobus graniferus</i>	(Canestrini, 1871)									mar	kog				nog	<i>Eudasyllobus niceensis</i> (see Chemini 1989)
<i>Dasylobus ligusticus</i>	(Roewer, 1923)									mar						<i>Eudasyllobus l.</i> (see Chemini 1989)
<i>Dicranopalpus gasteinensis</i>	Doleschall, 1852								blm	mar	kog				nog	SK: <i>Dicranopalpus</i> sp.: only juvenile specimens (Klimeš 2000) - might be also <i>fraternus</i> or a n. sp. (Klimeš pers. comm.)
<i>Dicranopalpus ramosus</i>	(Simon, 1909)	vhe	N						N							NL: Cuppen (1994); DE: Schmidt (2004)
<i>Egaenus convexus</i>	(C.L. Koch, 1835)							sta			kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Lacinius dentiger</i>	(C.L. Koch, 1847)							sta	blm		kog	kli	kli	kom	nog	1848 (see Brignoli 1985)
<i>Lacinius ephippiatus</i>	(C.L. Koch, 1835)	vhe	spo	sto	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Lacinius horridus</i>	(Panzer, 1794)	vhe		N	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	DK: Enghoff (1999)	
<i>Lophopilio palpalinis</i>	(Herbst, 1799)	vhe	spo	sto	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Megabunus armatus</i>	(Kulczyński, 1887)										kog				nog	
<i>Megabunus diadema</i>	(Fabricius, 1779)				sto											
<i>Megabunus lesserti</i>	Schenkel, 1927								blm	mar	kog					
<i>Megabunus rhinoceros</i>	(Canestrini, 1872)									mar						
<i>Metaphalangium cirtanum</i>	(Canestrini, 1872)													N	SI: Novak et al. (2002)	
<i>Metaplatybunus carnelutii</i>	Hadži, 1973													nog		
<i>Mitopus glacialis</i>	(Heer, 1845)								N	mar	kog				nog	DE: Muster (1999)
<i>Mitopus morio</i>	(Fabricius, 1779)	vhe	spo	sto	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	1799 (see Stol 2000)
<i>Odiellus granulatus</i>	(Canestrini, 1871)									mar						<i>O. coronatus</i> (see Chemini 1986)
<i>Odiellus spinosus</i>	(Bosc, 1792)	vhe	spo						blm	mar					nog	
<i>Oligolophus hansenii</i>	(Kraepelin, 1896)	vhe	spo	sto	sto	sto		sta	blm	N						CH: Cannata (1988); <i>O. hansenii</i>
<i>Oligolophus tridens</i>	(C.L. Koch, 1836)	vhe	spo	sto	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Opilio canestrinii</i>	(Thorell, 1876)	vhe	N	sto		sto		sta	blm	mar	kog	kli	kli		N	<i>O. ravennae</i> auct.; NL: Van der Weele (1993); SI: Novak et al. (2002)
<i>Opilio dinaricus</i>	Silhavy, 1938							sta	N		kog		kli	kom	nog	DE: Spelda et al. (2003)
<i>Opilio parietinus</i>	(De Geer, 1778)	vhe	spo	sto	N	sto	sto	sta	blm	N	kog	kli	kli	kom	nog	old record in CH was uncertain (Martens 1978); NO: Olsen (1995), CH: Dumitrescu (1987)
<i>Opilio ruzickai</i>	Silhavy, 1938										kog				nog	
<i>Opilio saxatilis</i>	C.L. Koch, 1839	vhe	spo	sto		sto		sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Opilio transversalis</i>	Roewer, 1956														nog	
<i>Paroligolophus agrestis</i>	(Meade, 1855)	vhe	spo	sto	sto	sto		sta	blm							
<i>Phalangium opilio</i>	Linnaeus, 1758	vhe	spo	sto	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	Linnaeus, 1761
<i>Platybunus bucephalus</i>	(C.L. Koch, 1835)							sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	nog	
<i>Platybunus pallidus</i>	Silhavy, 1938							sta				kli	kli	kom		FI: records uncertain (Martens 1978; Stol in litt.)
<i>Platybunus pinetorum</i>	(C.L. Koch, 1839)	vhe	N						blm	mar	kog					NL: Wijnhoven (1998)
<i>Rilaena triangularis</i>	(Herbst, 1799)	vhe	spo	sto	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Zacheus crista</i>	(Brullé, 1832)											kli	kli	kom		<i>Zachaeus</i> (see Crawford 1992)
Sclerosomatidae																
<i>Astrobus bernardinus</i>	Simon, 1879									mar						
<i>Astrobus helleri</i>	(Ausserer, 1867)									mar	kog				nog	
<i>Astrobus laevipes</i>	(Canestrini, 1872)		N					sta	blm		kog	kli	kli	kom	nog	NL: Wijnhoven (2003)
<i>Gyas annulatus</i>	(Olivier, 1791)								blm		kog				nog	CH: Locus typicus Switzerland, but no verified records
<i>Gyas titanus</i>	Simon, 1879							sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Homalenotus quadridentatus</i>	(Cuvier, 1795)	vhe	spo							mar						there are no verified records from DE
<i>Leiobunum blackwalli</i>	Meade, 1861	vhe	spo	sto		sto		sta	blm	mar		kli				
<i>Leiobunum limbatum</i>	L. Koch, 1861						sto	sta	blm	mar	kog	kli			nog	
<i>Leiobunum roseum</i>	C.L. Koch, 1839										kog				nog	

taxon	author	BE	NL	DK	NO	SE	FI	PL	DE	CH	AT	CZ	SK	HU	SI	synonyms, reference, notes
<i>Leiobunum rotundum</i>	(Latreille, 1798)	vhe	spo	sto	sto	sto		sta	blm	mar	kog	kli	kli	kom	nog	
<i>Leiobunum rupestre</i>	(Herbst, 1799)			sto	sto	sto	sto	sta	blm	mar	kog	kli		kom	nog	CH: old records (Lessert 1917) should be verified; records from northern Europe and northern Germany may belong to <i>L. tisciae</i> (Martens in litt.)
<i>Leiobunum subalpinum</i>	Komposch, 1998										kog					
<i>Leiobunum tisciae</i>	Avram, 1968							sta				kli	kli	kom		occurs presumably in other European countries and is not yet recognised (Martens 1978)
<i>Nelima apenninica</i>	Martens, 1969										kog					
<i>Nelima doriae</i>	(Canestrini, 1871)									N					nog	by Tedeschi & Sciaky (1996) announced new for CH, as the record of Lessert (1917) is not included in Martens (1978); CH: Lessert (1917)
<i>Nelima gothica</i>	Lohmander, 1945			sto	sto	sto	sto	sta	blm			kli				
<i>Nelima narcisi</i>	Novak & Slana, 2003													N	SI: Novak & Slana (2003)	
<i>Nelima sempronii</i>	Szalay, 1951							sta	blm		kog	kli	kli	kom	nog	<i>sempronii</i>
<i>Nelima silvatica</i>	(Simon, 1879)								blm	N						CH: Hänggi & Weiß (2003)

Literatur/references

- Bliss, P. & J. Martens (1995): Webspinnen. In: Platen, R., T. Blick, P. Bliss, R. Drogla, A. Malten, J. Martens, P. Sacher & J. Wunderlich: Verzeichnis der Spinnentiere (excl. Acarida) Deutschlands (Arachnida: Araneida, Opilionida, Pseudoscorpionida). – Arachnol. Mitt. Sonderband 1: 1-55.
- Brignoli P.M. (1985): On the correct dates of publication of the arachnid taxa described in some works by C.W. Hahn and C.L. Koch (Arachnida). – Bull. Br. arachnol. Soc. 6: 414-416.
- Cannata, L. (1988): Observations sur les opiliions de la tourbière du Cachot. – Bull. Soc. Neuchâtel Sci. Nat. 111: 67-70.
- Chemini, C. (1986): La collezione Canstrini di Opilioni (Arachnida) presso il Museo Zoologico dell'Università di Padova: Revisione e designazione di lectotipi. – Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. 11: 121-124.
- Chemini, C. (1989): Sulla sinonimia *Eudasyllobus* Roewer, 1911 = *Dasylobus* Simon, 1879, con designazione di lectotipo per *Dasylobus cavannae* Simon, 1882 (Arachnida: Opiliones). – Stud. Trentini Sci. Nat. Acta Biol. 65: 95-121.
- Cokendolpher, J.C. (1985): Erebomastriidae: replaced by Cladonychiidae (Arachnida: Opiliones). – Entomol. News 96: 36.
- Crawford, R.L. (1992): Catalogue of the genera and type species of the harvestman superfamily Phalangoidea (Arachnida). – Burke Mus. Contr. Anthropol. Nat. Hist. 8: 1-60.
- Cotti, G. (1989): Contributo alla conoscenza della fauna geobia del Monte Generoso (Canton Ticino, Svizzera). – Bol. Soc. Ticinese Sci Nat. 77: 13-34.
- Cuppen, J.G.M. (1994): *Dicranopalpus ramosus*, a new species of harvestman for the Netherlands (Opilionida: Phalangiidae). – Ent. Ber. Amsterdam 54: 176-178.
- Dumitrescu, D. (1987): Contribution à la connaissance de la faune d'opiliions (Arachnida) du canton de Fribourg (Suisse). – Bull. Soc. Fribourg Sc. Nat. 76: 136-143.
- Enghoff, H. (1999): *Lacinius horridus* (Panzer, 1794), en ny dansk mejer – samt lidt om Raghammer Odde, Bornholm. – Entomol. Meddel. 67: 137-139.
- Hänggi, A. & I. Weiß (2003): Spinnen (Araneae) und Webspinnen (Opiliones). In: Fauna und Flora auf dem Eisenbahngelände im Norden Basels. – Monogr. Entomol. Ges. Basel 1: 74-79 & 204-205 (Anhang 7).
- Heinäjoki, M. (1944): Die Opilionidenfauna Finnlands. – Acta Zool. Fennica 42: 1-26.
- Klimeš, L. (2000): Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. – Ekológia Bratislava 19, Suppl. 3: 125-128. <http://www.butbn.cas.cz/klimes/arachno/OPI.html>
- Komposch, C. (2004): The harvestmen fauna of Hungary (Arachnida, Opiliones). pp. 227-242. In: F. Samu & C. Szinetár (eds.): European Arachnology 2002. – 356 pp.; Budapest (Plant Prot. Inst.) & Szobmathely (Berzsenyi Coll.).
- Komposch, C. & J. Gruber (2004): Die Webspinnen Österreichs (Arachnida, Opiliones). – Denisia 12: 485-534.
- Kury, A.B. (2003): Checklist of valid genera of Opiliones of the world. – <http://acd.ufsj.br/mndi/Aracnologia/checklistinator.htm>
- Lessert, R. de (1917): Opiliions. – Catalogue Invertébr. Suisse 9: 1-80.
- Malten, A. (1999): Liste der bisher aus Hessen bekannten Webspinnen (Opiliones). Stand 9.1999. – <http://www.malten.de/Opiliones.html>
- Martens, J. (1978): Webspinnen, Opiliones – Spinnentiere, Arachnida. – Tierwelt Deutschlands 64: 1-464.

- Martens, J. & C. Chemini (1988) Die Gattung *Anelasmoecephalus* Simon, 1879. Biogeographie, Artgrenzen und Biospezies-Konzept (Opiliones: Trogulidae). – Zool. Jb. Syst. 115: 1-48.
- Muster, C. (1999): Fünf für Deutschland neue Spinnentiere aus dem bayerischen Alpenraum (Arachnida: Araneae, Opiliones). – Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck 86: 149-158.
- Novak, T. & J. Gruber (2000): Remarks on published data on harvestmen (Arachnida: Opiliones) from Slovenia. – Ann. Hist. Nat. 2 (21): 281-308.
- Novak, T. & L. Slana (2003): *Nelima narcisi* n. sp., a dwarf member of the genus from the north-eastern Adriatic coast. – Fragm. entomol. 35: 1-11.
- Novak, T., L. Slana, N. Cervek, M. Mlakar, N. Zmahir & J. Gruber (2002): Harvestmen (Opiliones) in human settlements of Slovenia. – Acta Entomol. Slovenica 10: 131-154.
- Olsen, K.M. (1995): *Opilio parietinus* (De Geer, 1778) (Arachnida, Opiliones) does belong to the Norwegian fauna. – Fauna norv. B 42: 66-67.
- Olsen, K.M. (2000): *Mitostoma chrysomelas* (Hermann, 1804) (Opilionida, Nemastomatidae), a harvestman new to Norway. – Norw. J. Entomol. 47: 24.
- Schmidt, C. (2004): Der Webspinne *Dicranopalpus ramosus* (Simon, 1909) (Arachnida, Opiliones, Phalangiidae) neu für Deutschland. – Mitt. Arbeitsgem. westf. Entomol. 20: 1-12.
- Skipper, L. (2003): Opiliones – mejere. – http://hjem.get2net.dk/lars_skipper/mejere1.htm
- Spelda, J., H. Rausch, D. Nährig & K.H. Harms (2003): Checkliste und Rote Liste der Webspinnen (Opiliones) Baden-Württembergs. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 7: 163-177.
http://www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/nafaweb/berichte/pas_07/pas0731.htm
- Spoek, G.L. (1975): Spinachtigen - Arachnida. III. De Hooiwagens (Opilionida) van Nederland. – Wetensch. Meded. Koninkl. Nederl. Natuurhist. Veren. 50: 1-31.
- Starega, W. (2000): Check-list of harvestmen (Opiliones) of Poland. – <http://www.arachnologia.edu.pl/kosarze.html>
- Stol, I. (1993): Check-list of North European Opiliones. – Fauna norv. B 40: 77-79.
- Stol, I. (2000): Harvestmen (Opiliones) from Hardangervidda. – Fauna Hardangervidda 21: 1-8.
- Stol, I. (2002): De nordiske langbeinartenes utbredelse (Opiliones), med forslag til norske navn. – Insekts-Nytt 27 (4): 11-20.
- Tedeschi, M. & R. Sciaky (1996): Opilioni (Arachnida Opiliones) della Svizzera cisalpina (Ticino, Moesano) raccolti dal Dr. Alessandro Focarile. – Boll. Soc. Tic. Sci. Natur. 84: 41-49.
- Van der Weele, R. (1993): *Opilio canestrinii* nieuw voor de nederlandse fauna (Opilionida: Phalangiidae). – Ent. Ber. Amsterdam 53: 91.
- Vanhercke, L. (1999): Opiliones in Belgium. – http://www.ips.be/_wbm/opilio/home.htm
- Weiß, I., T. Blick, H. Luka, L. Pfiffner & B. Walther (1998): *Trogulus martensi* Chemini, 1983 im Raum Basel (Arachnida, Opiliones, Trogulidae). – Arachnol. Mitt. 16: 21-30.
- Wijnhoven, H. (1998): De hooiwagen *Platybunus pinetorum*, nieuw voor de fauna van Nederland (Opiliones: Phalangiidae). – Ent. Ber. Amsterdam 58: 233-237.
- Wijnhoven, H. (2003): De hooiwagen *Astrobumus laevipes* nieuw voor Nederland (Opiliones: Phalangiidae). – Nederl. Faun. Meded. 19: 73-78.
- Wijnhoven, H. & P. Koomen (1997): *Nemastoma bimaculatum* in Nederland (Arachnida: Opilionida). – Nederl. Faun. Meded. 7: 5-6.

Dank/acknowledgements

Hiermit möchten wir (die Bearbeiter und die AraGes) allen danken, die zur Erstellung bzw. Aktualisierung beigetragen haben, insbesondere J. Gruber, L. Klimeš, J. Martens, C. Muster, T. Novak, W. Staręga, I. Stol, L. Vanhercke und H. Wijnhoven.

Herewith we (the authors and the AraGes) want to thank all, who contributed this list or its updating, especially J. Gruber, L. Klimeš, J. Martens, C. Muster, T. Novak, W. Staręga, I. Stol, L. Vanhercke and H. Wijnhoven.

Links

- Einführung / introduction: http://www.arages.de/checklist.html#2004_Intro
Überblick / overview http://www.arages.de/checklist.html#2004_Overview
Dank / acknowledgements http://www.arages.de/checklist.html#2004_Dank