

## Liste der Spinnen Baden-Württembergs (Araneae).

### Teil 2: Liste der Spinnen Baden-Württembergs excl. Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae.

zusammengestellt von Franz RENNER

unter Mitarbeit von Karl Hermann HARMS sowie Elisabeth BAUCHHENSS, Heiko BELLMANN, Theo BLICK, Claudia GACK, Ambros HÄNGGI, Josef KIECHLE, Angelika KOBEL-LAMPARSKI, Norbert LEIST, Andreas MALTEN, Dieter NÄHRIG, Ralph PLATEN, Werner ROSE, Günter SCHMIDT, Gaby TÖPFER-HOFMANN, Andreas WOLF und Jörg WUNDERLICH

**Abstract:** List of the Spiders of Baden-Württemberg (Germany). Part 2: List of the Spiders of Baden-Württemberg excl. Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae and Mysmenidae. The checklist contains informations about the spiders recorded from Baden-Württemberg since 1898.

**Key words:** Araneae, checklist, faunistics, Baden-Württemberg, Germany

**Danksagung:** Ich danke Gerd ALBERTI, Klaus DUMPERT, Otto von HELVERSEN, Horst KORGE, Ingetraut KÜHN, Helmut STUMPF für die Erlaubnis, unpublizierte Daten aus ihren Sammlungen verwenden zu dürfen. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart hat die Datenerhebung und Auswertung teilweise durch Bereitstellung von Finanzmitteln unterstützt. Ich danke Herrn Prof. Dr. Bernhard ZIEGLER, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart. Für technische Assistenz danke ich Matthias BUCHWEITZ, Karin MAYER und Gisela NEUBER.

Der in Heft 3 der Arachnologischen Mitteilungen veröffentlichte 1. Teil der Liste der Spinnen Baden-Württembergs umfaßte die Familien Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae. Teil 2 behandelt alle übrigen Familien. Im Anhang folgen Arten, deren Fundortangaben unsicher sind oder Arten, die als Einzelfunde gemeldet sind, aber nicht mehr belegt werden können. Weiterhin sind dort die baden-württembergischen "BÖSENBERG-Arten" aufgelistet sowie eingeschleppte bzw. synanthrope Arten genannt. Zur Methodik vgl. Teil 1 der Liste der Spinnen Baden-Württembergs (RENNER 1992).

## LISTE DER SPINNEN BADEN-WÜRTTEMBERGS - TEIL 2

### FAMILIE ATYPIDAE TAPEZIERSPINNEN

*Atypus affinis* EICHWALD, 1830

HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KRAUS & BAUR 1974, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977

*Atypus piceus* (SULZER, 1776)

BELLMANN 1984, BRAUN 1957, HARMS 1966, HÖFER 1989, KRAUS & BAUR 1974, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a

### FAMILIE PHOLCIDAE

#### ZITTERSPINNEN

*Pholcus opilionoides* (SCHRANK, 1781)

BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Pholcus phalangioides* (FUESSLIN, 1775)

BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, HÖFER 1989, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940

*Psilochorus simoni* (BERLAND, 1911)

Coll. GACK, Coll. ROSE

### FAMILIE SCYTODIDAE

#### SPEISPINNEN

*Scytodes thoracica* (LATREILLE, 1804)

HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895

### FAMILIE DYSDERIDAE

#### SECHSAUGENSPINNEN

*Dysdera crocata* C. L. KOCH, 1838

HANDKE & SCHREIBER 1985, HÖFER 1989

*Dysdera erythrina* (WALCKENAER, 1802)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

**Harpactea hombergi** (SCOPOLI, 1763)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Harpactea lepida** (C. L. KOCH, 1839)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Harpactes cf. Seidelli*)

**Harpactea rubicunda** (C. L. KOCH, 1839)

Coll. HARMS, Coll. KIECHLE, Coll. RENNER

## FAMILIE SEGESTRIIDAE

**Segestria bavarica** C. L. KOCH, 1843

MÜLLER & SCHENKEL 1895

**Segestria senoculata** (LINNAEUS, 1758)

BAEHR 1983a, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991

## FAMILIE OONOPIDAE

### ZWERGSECHSAUGENSPINNEN

**Tapinesthis inermis** (SIMON, 1882)

KRAUS 1967, Coll. WUNDERLICH

**Oonops domesticus** de DALMAS, 1916

Coll. WOLF, Coll. WUNDERLICH

## FAMILIE ERESIDAE

### RÖHRENSPINNEN

**Eresus cinnaberinus** (OLIVIER, 1789)

ELSNER 1930 (*Eresus quattuorguttatus*), KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Eresus niger*), LAUTERBORN 1922 (*Crythrophorus quadripustulatus*), LUNAU & RUPP 1988 (*Eresus niger*), MISIOCH 1977, WUNDERLICH 1975 (*Eresus niger*)

**Bemerkung:** Zur Nomenklatur vgl. MERRETT & MILLIDGE 1992

## FAMILIE ZODARIIDAE

### AMEISENJÄGER

**Zodarion germanicum** (C. L. KOCH, 1837)

BAUCHHENSS & SCHOLL 1985, Coll. ROSE

**Zodarion italicum** (CANESTRINI, 1868)

KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988 (*Zodarion gallicum*), MISIOCH 1977  
(*Zodarion germanicum*, HARMS rev. in litt.), SIEPE 1985, WUNDERLICH 1980a

**Bemerkung:** Zum Status von *Z. italicum* und *Z. gallicum* vgl. BOSMANS 1988. In HEIMER & NENTWIG 1991 wird *Z. italicum* als *Z. gallicum* geführt.

**Zodarion rubidum** SIMON, 1914

Coll. LEIST, Coll. ROSE, Coll. WUNDERLICH

## FAMILIE ULOBORIDAE KRÄUSELRADNETZSPINNEN

**Hyptiotes paradoxus** (C. L. KOCH, 1834)

BELLMANN 1984, HÖFER 1989, SCHENKEL 1925, STADLER & SCHENKEL 1940

**Uloborus walckenaerius** (LATREILLE, 1806)

LEIST 1978, Coll. LEIST

## FAMILIE TETRAGNATHIDAE DICKKIEFER- UND STRECKERSPINNEN

**Pachygnatha clercki** SUNDEVALL, 1823

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, SCHMID 1967, SIEPE 1985, ZIER 1985

**Pachygnatha degeeri** SUNDEVALL, 1830

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1925, SCHMID 1967, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Pachygnatha listeri** SUNDEVALL, 1830

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1990a, RENNER & TRAUTNER 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Tetragnatha dearmata** THORELL, 1873

WUNDERLICH 1973a

**Tetragnatha extensa** (LINNAEUS, 1758)

BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, HEUBLEIN 1980, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, KLEIBER 1911, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, SCHMID 1967, STRAND 1907a, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Tetragnatha montana** SIMON, 1874

DETTNER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tetragnatha solandri*), NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925 (*Tetragnatha ? solandri*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Tetragnatha nigrita* LENDL, 1886**

BÖSENBERG 1903, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1918, Coll. HARMS

***Tetragnatha obtusa* C. L. KOCH, 1837**

LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925

***Tetragnatha plinicola* L. KOCH, 1870**

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHMID 1979, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Tetragnatha striata* L. KOCH, 1862**

Coll. HARMS, Coll. WUNDERLICH

**FAMILIE METIDAE**

**HERBSTSPINNEN**

***Meta menardi* (LATREILLE, 1804)**

BÖSENBERG 1903, DOBAT 1975a, HÖFER 1989, LEIST 1978, STRAND 1907a

**Bemerkung:** DOBAT 1975a nennt über 60 Fundorte in Höhlen der Schwäbischen Alb.

***Meta mengel* (BLACKWALL, 1869)**

DETTNER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987 (*Metellina mengel*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Meta meriana* (SCOPOLI, 1763)**

BÖSENBERG 1903, DOBAT 1975a, HARMS 1966, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Meta segmentata* (CLERCK, 1757)**

BAEHR 1983a (*Meta reticulata*), BAEHR & BAEHR 1984 (*Meta reticulata*), BAUER 1982, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, DETTNER 1985, DOBAT 1975a (*Meta reticulata* var. *mengel*), HAFNER 1991, HARMS 1966, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987 (*Metellina segmentata*), SCHENKEL 1925, STRAND 1907a (*Meta reticulata*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Zygella atrica* (C. L. KOCH, 1845)**

Coll. HARMS

***Zygella montana* (C. L. KOCH, 1839)**

BÖSENBERG 1903 (*Zilla montana*), Coll. HARMS

***Zygella stroemi* (THORELL, 1870)**

BÖSENBERG 1903, Coll. HARMS

***Zygella x-notata* (CLERCK, 1757)**

BÖSENBERG 1903 (*Zilla x-notata*), HARMS 1966, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Zilla x-notata*), STRAND 1907a (*Aranea (Zilla) litterea*)

**FAMILIE THERIDIOSOMATIDAE**

**ZWERGRADNETZSPINNEN**

***Theridiosoma gemmosum* (L. KOCH, 1877)**

DUMPERT & PLATEN 1985, LEIST 1978, MISIOCH 1977

# FAMILIE ARANEIDAE RADNETZSPINNEN

*Aculepeira ceropegia* (WALCKENAER, 1802)

BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1980, BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, STRAND 1907a, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985

*Agalenataea redii* (SCOPOLI, 1763)

HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1970, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Epeira sollers*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Araneus alsine* (WALCKENAER, 1802)

BELLMANN 1980, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Araneus angulatus* CLERCK, 1757

HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, Coll. NÄHRIG

*Araneus diadematus* CLERCK, 1757

BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1925, STRAND 1907a, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Araneus grossus* (C. L. KOCH, 1845)

MISIOCH 1977, WIEHLE 1963

**Bemerkung:** Eventuell verdriftes Weibchen, vgl. MISIOCH 1977: 142.

*Araneus marmoreus* CLERCK, 1757

GÜNZL 1989, LEIST 1978, (*A. var. pyramidatus*), MIOTK 1983 (*A. var. pyramidatus*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Epeira pyramidata*)

*Araneus quadratus* CLERCK, 1757

BAEHR & BAEHR 1984, GÜNZL 1989, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, STRAND 1907a, STRAND 1907a (*Aranea reaumur*)

*Araniella alpica* (L. KOCH, 1869)

BLANKE 1982, BÖSENBERG 1903, DETTNER 1985, LEIST 1978, SCHENKEL 1925

*Araniella cucurbitina* (CLERCK, 1757)

BAEHR & BAEHR 1984, BLANKE 1982, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, SCHMID 1967, STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Bemerkung:** *A. opisthographa* wurde lange Zeit als Varietät von *A. cucurbitina* gewertet (vgl. BLANKE 1982). Ältere Zitate von *A. cucurbitina* könnten daher auch *A. opisthographa* betreffen.

*Araniella opisthographa* (KULCZYNSKI, 1905)

BLANKE 1982, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Bemerkung:** vgl. *A. cucurbitina*

*Araniella proxima* (KULCZYNSKI, 1885)

Coll. HARMS

*Argiope bruennichi* (SCOPOLI, 1772)

BELLMANN 1980, BÖSENBERG 1903, ELSNER 1930, GATTER, JÜNGLING & MÜLLER 1976, GAUCKLER 1965, GOLDER, 1921, GOLDER 1929, GOLDER 1944, GUTTMANN 1979,

HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1970, LEIST 1978, LOCK 1950, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985

*Atea sturmii* (HAHN, 1831)

BAEHR 1983a, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1970, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Atea triguttata* (FABRICIUS, 1775)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, STADLER & SCHENKEL 1940

*Cercidia prominens* (WESTRING, 1851)

BAEHR 1983a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Cyclosa conica* (PALLAS, 1772)

BELLMANN 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Cyclosa oculata* (WALCKENAER, 1802)

HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1918

*Gibbaranea bituberculata* (WALCKENAER, 1802)

BELLMANN 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, (*Epeira dromedaria*), NÄHRIG 1987, STRAND 1916 (*Aranea dromedaria*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Gibbaranea gibbosa* (WALCKENAER, 1802)

BÖSENBERG 1903, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Epeira arbustorum*), NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Gibbaranea omoeda* (THORELL, 1870)

HARMS 1966

*Hypsosinga albovittata* WESTRING, 1851

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, LEIST 1978

*Hypsosinga heri* (HAHN, 1831)

HARMS 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Hypsosinga pygmaea* (SUNDEVALL, 1832)

HOFFMANN 1980, MÜLLER & SCHENKEL 1895, Coll. NÄHRIG

*Hypsosinga sanguinea* (C. L. KOCH, 1844)

BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Larinioides cornutus* (CLERCK, 1757)

BAEHR & BAEHR 1984 (*Araneus foliatus*), BAUER 1982, GÜNZL 1989, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER & DICK 1992, SCHMID 1967

*Larinioides patagiatus* (CLERCK, 1757)

LEIST 1978, MISIOCH 1977 (*Araneus ocellatus*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, SCHENKEL 1925

*Larinioides sclopetarius* (CLERCK, 1757)

BELLMANN 1984, GÜNZL 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a (*Aranea undata*)

*Mangora acalypha* (WALCKENAER, 1802)

DETTLER 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Neoscona adlanta* (WALCKENAER, 1802)

BÖSENBERG 1903, LEIST 1970, MISIOCH 1977

*Nuctenea silvicutrix* (C. L. KOCH, 1846)

Coll. HARMS

*Nuctenea umbratica* (CLERCK, 1757)

HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, STADLER & SCHENKEL 1940 (*Araneus sexpunctata*), STRAND 1907a (*Araneus sexpunctata*)

*Singa hamata* (CLERCK, 1757)

BAUER 1982, BELLMANN 1980, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Singa nitidula* C. L. KOCH, 1844

BAUER 1982, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a

*Zilla diodia* (WALCKENAER, 1802)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991

## FAMILIE MIMETIDAE

### SPINNENFRESSER

*Ero aphana* (WALCKENAER, 1802)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Ero cambridgei* KULCZYNSKI, 1911

HARMS 1987

*Ero furcata* (VILLERS, 1789)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1984, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Ero thoracica*), NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, STADLER & SCHENKEL 1940

*Ero tuberculata* (DE GEER, 1778)

Coll. HARMS

## FAMILIE LYCOSIDAE

### WOLFSPINNEN

*Acantholycosa norvegica* (THORELL, 1872)

Coll. HARMS

*Alopecosa accentuata* (LATREILLE, 1817)

BAEHR & BAEHR 1984 (*Alopecosa barbipes*), BELLMANN 1984 (*Alopecosa barbipes*), BÖSENBERG 1903 (*Tarentula andrenivora*), BÖSENBERG 1903, DAHL 1908, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Alopecosa barbipes*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tarentula andrenivora*), STRAND 1907a

**Bemerkung:** Bisher wurde *Alopecosa barbipes* als Synonym von *A. accentuata* gedeutet. CORDES & von HELVERSEN 1990 interpretieren *A. accentuata* und *A. barbipes* als "sibling species".

***Alopecosa aculeata* (CLERCK, 1757)**

HAFNER 1991, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*A. pulverulenta* große Form), Coll. HARMS

**Bemerkung:** Bislang wurde *A. taeniatata* (C. L. KOCH, 1835) als Synonym von *A. aculeata* gedeutet. KRONESTEDT 1990 konnte den Artstatus von *A. taeniatata* belegen. Das gesamte *A. aculeata*-Material ist daher revisionsbedürftig.

***Alopecosa cuneata* (CLERCK, 1757)**

DAHL 1908, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SIEPE 1985

***Alopecosa cursor* (HAHN, 1831)**

Coll. LEIST

***Alopecosa fabrilla* (CLERCK, 1757)**

KOBEL-LAMPARSKI 1987, Coll. LEIST

***Alopecosa Inquillina* (CLERCK, 1757)**

BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, HARMS 1966, LEIST 1978, STRAND 1907a

***Alopecosa pulverulenta* (CLERCK, 1757)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (*Tarentula pulverulenta*), DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1980 (*Tarentula pulverulenta*), HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tarentula pulverulenta*), RENNER 1986, RENNER & DICK 1992, ZIER 1985

***Alopecosa striatipes* (C. L. KOCH, 1839)**

DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927, von HELVERSEN 1974

**Synonym:** *Alopecosa striata* KULCZYNSKI, 1895

***Alopecosa sulzeri* (PAVESI, 1873)**

HÖFER 1989, MISIOCH 1977, WIEHLE 1967

***Alopecosa taeniata* (C. L. KOCH, 1835)**

Coll. HARMS, Coll. CORDES, Coll. von HELVERSEN

***Alopecosa trabalis* (CLERCK, 1757)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Tarentula trabialis*), DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (*Tarentula trabalis*), HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tarentula trabalis*)

***Arctosa cinerea* (FABRICIUS, 1777)**

MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Trochosa cinerea*)

***Arctosa figurata* SIMON, 1876**

BAEHR & BAEHR 1984, HEUBLEIN 1983

***Arctosa leopardus* (SUNDEVALL, 1832)**

BAUER 1982, DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927, HARMS 1966 (*Megarctosa leopardus*), von HELVERSEN 1974, KLEIBER 1911 (*Lycosa leopardus*), LEIST 1978 (*Megarctosa leopardus*), ZIER 1985

***Arctosa maculata* (HAHN, 1822)**

BÖSENBERG 1903 (*Trochosa amyacea*), STRAND 1907a (*Tarentula amyacea*), Coll. HARMS, Coll. RENNER, Coll. ROSE

*Arctosa perita* (LATREILLE, 1799)

Coll. HARMS

*Arctosa stigmosa* (THORELL, 1875)

MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Trochosa stigmosa*)

*Aulonia albimana* (WALCKENAER, 1805)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1984, DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Hygrolycosa rubrofasciata* (OHLERT, 1865)

BAEHR 1983a, von HELVERSEN 1974, LEIST 1978, ZIER 1985

*Pardosa agrestis* (WESTRING, 1861)

DAHL 1908, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895

**Bemerkung:** Da die Unterscheidung zwischen *P. agrestis*, *P. agricola*, und *P. torrentum* nicht einfach ist, wird hier nochmals auf TONGIORGI 1966a, 1966b verwiesen.

*Pardosa agricola* (THORELL, 1856)

HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Pardosa alacris* (C. L. KOCH, 1837)

HANDKE & SCHREIBER 1985 (sub *Pardosa lugubris*, MALTEN rev. in lit), Coll. NÄHRIG, Coll. RENNER, Coll. WOLF

Synonym: *Pardosa pseudolugubris*

**Bemerkung:** Vgl. KRONESTEDT 1992 und Bemerkung bei *Pardosa lugubris*.

*Pardosa amentata* (CLERCK, 1757)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (*Lycosa saccata*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, von HELVERSEN 1974, HÖFER 1989, KLEIBER 1911, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER 1986, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHMID 1967, SIEPE 1985, STRAND 1907a (*Lycosa saccata*), STRAND 1907a (*Lycosa annulata*), ZIER 1985

*Pardosa bifasciata* (C. L. KOCH, 1834)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Lycosa bifasciata*), HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Passiana bifasciata*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Pardosa hortensis* (THORELL, 1872)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Lycosa hortensis*), DAHL 1908, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SIEPE 1985

*Pardosa lugubris* (WALCKENAER, 1802)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DAHL 1908, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1980 (*Lycosa lugubris*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SIEPE 1985, STRAND 1916 (*Lycosa lugubris*), WOLF & ZIMMERMANN 1991, WUNDERLICH 1984

**Bemerkung:** WUNDERLICH 1984 hat aus *Pardosa lugubris* *P. pseudolugubris* herausgelöst.

Diese Art wurde von KRONESTEDT 1992 mit *Pardosa alacris* synonymisiert. Weiterhin wurden aus der *P. lugubris*-Gruppe zwei weitere Arten charakterisiert (vgl. TÖPER-HOFMANN & von

HELVERSEN 1990), die auch in Baden-Württemberg vorkommen dürften. Das gesamte Material von *Pardosa lugubris* ist somit stark revisionsbedürftig.

**"Pardosa lugubris"** Art D gem. TÖPFER-HOFMANN 1990

Coll. NÄHRIG

Bemerkung: vgl. TÖPFER-HOFMANN & von HELVERSEN 1990.

***Pardosa monticola*** (CLERCK, 1757)

BÖSENBERG 1903 (*Lycosa agrestis*), DAHL 1908, CASEMIR 1961 (*Lycosa monticola*), DAHL & DAHL 1927, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1916 (*Lycosa monticola*)

***Pardosa nigriceps*** (THORELL, 1856)

HANKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Pardosa paludicola*** (CLERCK, 1757)

DOBAT 1975a, von HELVERSEN 1974, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

***Pardosa palustris*** (LINNAEUS, 1758)

BAEHR & BAEHR 1984 (*Pardosa tarsalis*), DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (*Lycosa tarsalis*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANKE & SCHREIBER 1985, von HELVERSEN 1974, LEIST 1978, RENNER & TRAUTNER 1987, STRAND 1907a (*Lycosa palustris*)

***Pardosa prativaga*** (L. KOCH, 1870)

BAUER 1982, DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (*Lycosa riparia*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, von HELVERSEN 1974, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MIOTK 1983, SIEPE 1985

***Pardosa proxima*** (C. L. KOCH, 1847)

von HELVERSEN & HARMS 1969, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Pardosa pullata*** (CLERCK, 1757)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Lycosa pullata*), DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (*Lycosa pullata*), DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1983, KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER 1986, RENNER & TRAUTNER 1987, RENNER & DICK 1992, SCHMID 1967, ZIER 1985

***Pardosa riparia*** (C. L. KOCH, 1833)

BAEHR & BAEHR 1984, HÖFER 1989

***Pardosa sphagnicola*** DAHL, 1908

HOFFMANN 1980, RENNER 1986, RENNER & DICK 1992, ZIER 1985

***Pardosa torrentum*** SIMON, 1876

MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Pardosa wagleri*** (HAHN, 1822)

von HELVERSEN 1974, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Pirata hygrophilus*** (THORELL, 1872)

BAEHR 1983a, DAHL 1908, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GÜNZL 1989, HAFNER 1991, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1980, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER 1986, SIEPE 1985, ZIER 1985

***Pirata knorri*** (SCOPOLI, 1763)

Coll. HARMS, Coll. RENNER

***Pirata latitans*** (BLACKWALL, 1841) BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, DAHL 1908, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GÜNZL 1989, HAFNER 1991, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HOFFMANN 1980, RENNER 1986, ZIER 1985

**Pirata piraticus** (CLERCK, 1757)

BAEHR 1983a, BAUER 1982, DAHL 1908, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GÜNZL 1989, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1990a, RENNER 1986, SCHMID 1967, SIEPE 1985

**Pirata piscatorius** (CLERCK, 1757)

DAHL 1908, DETTNER 1985, GÜNZL 1989, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER 1986, ZIER 1985

**Pirata tenultarsis** SIMON, 1876

GÜNZL 1989, von HELVERSEN 1974 (*Pirata moravicus*), von HELVERSEN & HARMS 1969 (*Pirata moravicus*), HOFFMANN 1980, RENNER 1986, WUNDERLICH 1973c (*Pirata moravicus*), ZIER 1985

**Pirata ulliginosus** (THORELL, 1856)

BAEHR 1983a, DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927, GÜNZL 1989, HAFNER 1991, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, RENNER 1986

**Tricca lamperti** (DAHL, 1908)

BÖSENBERG 1903 (*Lycosa Simonii*), RENNER & DICK 1992, ZIER 1985 (*Arctosa lamperti*)

**Tricca lutetiana** (SIMON, 1876)

BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Triccosta lucorum*), HEUBLEIN 1983, KLEIBER 1911 (*Lycosa lucorum*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978 (*Triccosta lucorum*), LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, WIEHLE 1967

**Trochosa robusta** (SIMON, 1876)

BÖSENBERG 1903, DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (*Trochosa lapidicola*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WUNDERLICH 1972

**Trochosa ruricola** (DE GEER, 1778)

BAUER 1982, BRAUN 1957, von HELVERSEN 1974, HÖFER 1989, KLEIBER 1911 (*Lycosa ruricola*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SIEPE 1985

**Trochosa spinipalpis** (F. O. P.-CAMBRIDGE, 1895)

BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DAHL 1908, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, von HELVERSEN 1974, HOFFMANN 1980, MISIOCH 1977, RENNER & DICK 1992, ZIER 1985

**Trochosa terricola** THORELL, 1856

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DAHL 1908, DETTNER 1985, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Trochosina terricola*), von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1983, KLEIBER 1911 (*Lycosa terricola*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978 (*Trochosina terricola*), LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SIEPE 1985, STRAND 1907a (*Tarentula terricola*), ZIER 1985

**Xerolycosa miniata** (C. L. KOCH, 1834)

HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tarentula miniata*), SCHENKEL 1918 (*Lycosa miniata*)

**Xerolycosa nemoralis** (WESTRING, 1861)

BAEHR 1983a, DAHL 1908, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KLEIBER 1911 (*Lycosa nemoralis*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tarentula nemoralis*), RENNER & DICK 1992, SIEPE 1985, STRAND 1916 (*Tarentula nemoralis*)

## FAMILIE PISAURIDAE RAUB- ODER JAGDSPINNEN

*Dolomedes flimbratus* (CLERCK, 1757)

DAHL 1908, DETTNER 1985, KLEIBER 1911, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER 1987, SCHENKEL 1925

*Dolomedes plantarius* (CLERCK, 1757)

BÖSENBERG 1903, RENNER 1987

*Pisaura mirabilis* (CLERCK, 1757)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1984, DAHL 1908, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, NÄHRIG 1987, RENNER & DICK 1992, SCHMID 1967, STRAND 1907a (*Pisaura rufofasciata*), STRAND 1916 (*Pisaura rufofasciata*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

## FAMILIE OXYOPIDAE SCHARFAUGENSPINNEN

*Oxyopes ramosus* (PANZER, 1804)

HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991

## FAMILIE AGELENIDAE TRICHTERNETZSPINNEN

*Agelena gracilens* C. L. KOCH, 1841

HARMS 1966, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Agalena similis*)

*Agelena labyrinthica* (CLERCK, 1757)

HEUBLEIN 1983, LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a

*Cicurina cicur* (FABRICIUS, 1793)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1925, SIEPE 1985

*Coelotes inermis* (L. KOCH, 1855)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Amaurobius inermis*), HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988

*Coelotes terrestris* (WIDER, 1834)

ALBERT et al. 1987, BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER

1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Amaurobius terrestris*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Coelotes atropos*), NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, STADLER & SCHENKEL 1940 (*Coelotes atropos*), STRAND 1907a, STRAND 1916  
Bemerkung: Bis WIEHLE 1963 wurden *C. terrestris* und *C. atropos* häufig verwechselt. Da *C. atropos* für Baden-Württemberg noch nicht sicher nachgewiesen ist, wurden alle Nennung von *C. atropos* als *C. terrestris* gewertet.

***Cryptoecea silvicola* (C. L. KOCH, 1834)**

BAEHR 1983a, CASEMIR 1961, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, SCHENKEL 1925

***Histopona torpida* (C. L. KOCH, 1834)**

ALBERT et al. 1987, BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DOBAT 1975a (*Tegenaria torpida*), DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977 (*Tegenaria torpida*), MISIOCH 1977 (sub *Tegenaria picta*, HARMS rev. in litt.), MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

***Mastigusa arietina* (THORELL, 1871)**

HANDKE & SCHREIBER 1985, Coll. ROSE

**Synonym:** *Tetrilus arietinus*, *Tuberta arietina*

Bemerkung: Zur Synonymie vgl. WUNDERLICH 1986

***Tegenaria agrestis* (WALCKENAER, 1802)**

HEUBLEIN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Tegenaria atrica* C. L. KOCH, 1834**

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988 (*Tegenaria larva*), MISIOCH 1977

***Tegenaria domestica* (CLERCK, 1757)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Tegenaria derhami*), HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, STRAND 1907a (*Tegenaria derhami*)

***Tegenaria ferruginea* (PANZER, 1804)**

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Tegenaria Guyonii*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a

***Tegenaria picta* SIMON, 1870**

BÖSENBERG 1903 (*Tegenaria pusilla*)

***Tegenaria silvestris* L. KOCH, 1872**

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Textrix denticulata* (OLIVIER, 1789)**

BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Tuberta maerens* (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)**

Coll. KIECHLE, Coll. WUNDERLICH

## FAMILIE CYBAEIDAE

***Cybaeus tetricus* (C. L. KOCH, 1839)**

BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, LAMPARSKI 1988, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895

## FAMILIE ARGYRONETIDAE WASSERSPINNEN

*Argyroneta aquatica* (CLERCK, 1757)

BAUR 1961, LEIST 1978, SCHNEIDER 1968 ("Wasserspinne"), STRAND 1907a

## FAMILIE HAHNIIDAE

*Antistea elegans* (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DUMPERT & PLATEN 1985, HAFNER 1991, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

*Hahnia candida* SIMON, 1875

HARM 1966, Coll. DUMPERT

*Hahnia helveola* SIMON, 1875

BAEHR 1983a, DAHL M. 1937 (*Hahnia bressica*), HARMS 1966 (*Hahnia bressica*), HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Hahnia montana* (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Hahnia cacuminata*), DAHL M. 1937 (*Hahnia cacuminata*), DAHL M. 1937 (*Hahnia muscicola*), DUMPERT & PLATEN 1985, HAFNER 1991, HARM 1966, HARMS 1966

*Hahnia nava* (BLACKWALL, 1841)

BAEHR & BAEHR 1984, DAHL M. 1937, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966

*Hahnia ononidum* SIMON, 1875

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Hahnia mengel*), DAHL M. 1937 (*Hahnia mengel*), HARMS 1966 (*Hahnia jacksoni*), MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Hahnia pratensis*)

*Hahnia pusilla* C. L. KOCH, 1841

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

## FAMILIE DICTYNIDAE KRÄUSELSPINNEN

*Altella bluncata* (MILLER, 1949)

WUNDERLICH 1973c, WUNDERLICH 1974

*Altella lucida* (SIMON, 1874)

WIEHLE 1967 (*Altella bertkau*), WUNDERLICH 1974

*Argenna subnigra* (O. P.-CAMBRIDGE, 1861)

HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978

*Dictyna arundinacea* (LINNAEUS, 1758)

BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Dictyna civica* (LUCAS, 1849)

BRAUN 1956, WIEHLE 1953

*Dictyna latens* (FABRICIUS, 1775)

LEIST 1978, Coll. NÄHRIG

*Dictyna mitis* (THORELL, 1875)

WUNDERLICH 1973a (*Dictyna (Emblyna) annulipes*)

*Dictyna pusilla* THORELL, 1856

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, WIEHLE 1953, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Dictyna uncinata* THORELL, 1856

HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

*Lathys humilis* (BLACKWALL, 1855)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, HÖFER 1989, LUNAU & RUPP 1988, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Lathys puta* (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)

HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, WIEHLE 1967 (*Lathys similis*), WUNDERLICH 1974

Synonym: *Lathys stigmatisata*

*Nigma flavescens* (WALCKENAER, 1825)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

*Nigma puella* (SIMON, 1870)

NÄHRIG 1987

*Nigma walckenaeri* (ROEWER, 1951)

LEIST 1978, Coll. HARMS, Coll. ROSE

## FAMILIE AMAUROBIIDAE

### FINSTERSPINNEN

*Amaurobius crassipalpis* CANESTRINI & PAVESI, 1870

Coll. HARMS

Synonym: *Amaurobius tessinensis* DRESCO, 1977

*Amaurobius fenestralis* (STROEM, 1768)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, DOBAT 1975a, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HARMS 1966 (*Ciniflo fenestralis*), HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940 (*Ciniflo fenestralis*), STRAND 1907a

*Amaurobius ferox* (WALCKENAER, 1830)

HARMS 1966 (*Ciniflo ferox*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977 (*Ciniflo ferox*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940 (*Ciniflo ferox*)

*Amaurobius similis* (BLACKWALL, 1861)

BÖSENBERG 1903, MISIOCH 1977

*Callobius claustrarius* (HAHN, 1833)

Coll. HARMS, Coll. MALTEN

## FAMILIE TITANOECIDAE

*Titanoeca quadriguttata* (Hahn, 1831)

BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Titanoeca obscura*), HARMS 1966, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940 (*Titanoeca obscura*), WIEHLE 1967 (*Titanoeca obscura*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

## FAMILIE ANYPHAENIDAE

ZARTSPINNEN

*Anyphaena accentuata* (WALCKENAER, 1802)

BAEHR 1983a, BELLMANN 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

## FAMILIE LIOCRANIDAE

*Agraecina striata* (KULCZYNSKI, 1882)

LEIST 1978 (*Agroeca striata*), MISIOCH 1977, Coll. HARMS

*Agroeca brunnea* (BLACKWALL, 1833)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1986, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, LEIST 1978 (*Agelena brunnea*), LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Agroeca haglundi*), REIMOSER 1937b, ZIER 1985

*Agroeca lusatica* (L. KOCH, 1875)

BÖSENBERG 1903, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI 1989

*Agroeca proxima* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1986, HANDKE & SCHREIBER 1985, REIMOSER 1937b

*Agroeca pullata* THORELL, 1875

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Agroeca cuprea*), HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Agroeca cuprea*), LUNAU & RUPP 1988 (*Agroeca cuprea*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Agroeca chrysea*)

*Apostenus fuscus* WESTRING, 1851

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, GRIMM 1986, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Liocranum rupicola* (WALCKENAER, 1825)

GRIMM 1986, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Liocranum domesticum*)

*Liocranum rutilans* (THORELL, 1875)

Coll. HARMS

*Phrurolithus festivus* (C. L. KOCH, 1835)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1986, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, WIEHLE 1967, ZIER 1985

*Phrurolithus minimus* C. L. KOCH, 1839

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1986, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, REIMOSER 1937b, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Scotina celans* (BLACKWALL, 1841)

GRIMM 1986, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, SIEPE 1985

*Scotina gracilipes* (BLACKWALL, 1859)

KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Agroeca gracilipes*)

*Scotina pallardi* (L. KOCH, 1881)

BAEHR & BAEHR 1984, GRIMM 1986

## FAMILIE CORINNIDAE

*Ceto laticeps* (CANESTRINI, 1868)

BÖSENBERG 1903 (*Trachelas nitescens*), GRIMM 1986, HARMS 1966, NÄHRIG 1987, REIMOSER 1937b, WIEHLE 1965

## FAMILIE CLUBIONIDAE

### SACKSPINNEN

*Cheiracanthium campestre* LOHMANDER, 1944

HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Cheiracanthium dumetorum*, MALTEN rev. in litt.)

*Cheiracanthium effosum* HERMAN, 1879

HARMS 1966, WIEHLE 1967

*Cheiracanthium elegans* THORELL, 1875

KOBEL-LAMPARSKI 1987

*Cheiracanthium erraticum* (WALCKENAER, 1802)

HARMS 1966 (*Cheiracanthium dumetorum*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Cheiracanthium mildei* L. KOCH 1864

Coll. HARMS, Coll. KÜHN, Coll. WOLF

*Cheiracanthium pennyl* O. P.-CAMBRIDGE, 1873

LEIST 1970, LEIST 1978, WOLF 1989

*Cheiracanthium punctorum* (VILLERS, 1789)

BELLMANN 1984, HEUBLEIN 1983, LEIST 1970, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Cheiracanthium virescens* (SUNDEVALL, 1833)

GOLDER, 1921 (*Chiracanthium nutrix*), HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, MISIOCH 1977, WOLF 1989

- Clubiona brevipes* BLACKWALL, 1841  
 BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987
- Clubiona caerulescens* L. KOCH, 1866  
 BAEHR 1983a, HARMS 1966, HÖFER 1989, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895
- Bemerkung:** Zur Schreibweise vgl. MERRETT & MILLIDGE 1992
- Clubiona comta* C. L. KOCH, 1839  
 BAEHR 1983a, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991
- Bemerkung:** Zur Schreibweise vgl. MERRETT & MILLIDGE 1992
- Clubiona corticella* (WALCKENAER, 1802)  
 BÖSENBERG 1903, LEIST 1978, WUNDERLICH 1982
- Clubiona diversa* O. P.-CAMBRIDGE, 1862  
 CASEMIR 1961, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895
- Clubiona frutetorum* L. KOCH, 1866  
 HARMS 1966, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918,
- Clubiona germanica* THORELL, 1870  
 BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895
- Clubiona kulczynskii* de LESSERT, 1905  
 BAUCHHENSS, DEHLER & SCHOLL 1987, Coll. KORGE
- Clubiona lutescens* WESTRING, 1851  
 GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, SCHENKEL 1918
- Clubiona marmorata* L. KOCH 1866  
 Coll. HARMS
- Clubiona neglecta* O. P.-CAMBRIDGE, 1862  
 BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987
- Bemerkung:** BRAUN & RABELER 1969 schließen nicht aus, daß *C. neglecta* und *C. similis* oft miteinander verwechselt wurden, da in REIMOSER 1937b die Vulvenabbildungen vertauscht sind.
- Clubiona norvegica* STRAND, 1900  
 Coll. HARMS, Coll. RENNER
- Clubiona pallidula* (CLERCK, 1757)  
 BAEHR 1983a, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987
- Clubiona phragmitis* C. L. KOCH, 1843  
 GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895
- Clubiona reclusa* O. P.-CAMBRIDGE, 1863  
 BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HARMS 1966, HÖFER 1989, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, SCHMID 1967, WOLF & ZIMMERMANN 1991
- Clubiona similis* L. KOCH 1866  
 MÜLLER & SCHENKEL 1895
- Bemerkung:** MÜLLER & SCHENKEL (1895: 762) fanden die Art "am Ufer der Wiese" und melden sie "Neu für d. Schweiz". Die Wiese ist der Grenzfluß zwischen Basel (CH) und Weil am Rhein (D). De LESSERT (1910: 404) nennt als Fundort "Grande Duché de Bade: Bords de la Wiese" und nennt als Quelle MÜLLER & SCHENKEL 1895. Vgl. Bemerkung bei *C. neglecta*.

*Clubiona stagnatilis* KULCZYNSKI, 1897

BAUER 1982, BELLMANN 1984, GÜNZL 1989, HARMS 1987, HOFFMANN 1980

*Clubiona subsultans* THORELL, 1875

HAFNER 1991, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, STRAND 1907a

*Clubiona subtilis* L. KOCH, 1867

HARMS 1966, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Clubiona terrestris* WESTRING, 1851

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918

*Clubiona trivialis* C. L. KOCH, 1843

CASEMIR 1961, HARMS 1966, KLEIBER 1911, LEIST 1978, ZIER 1985

## FAMILIE GNAPHOSIDAE

### GLATTBAUCHSPINNEN

*Callilepis nocturna* (LINNAEUS, 1758)

GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Drassodes* cf. *nocturna*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Pythonissa nocturna*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Callilepis schuszteri* (HERMAN, 1879)

BAEHR & BAEHR 1984, GRIMM 1985, HÖFER 1989, WIEHLE 1967

*Drassodes lapidosus* (WALCKENAER, 1802)

BAEHR & BAEHR 1984 (*Drassodes cupreus*), BAUER 1982 (*Drassodes cupreus*), BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Drassodes lapidosus* var. *cuprea*), GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, REIMOSER 1937a, STADLER & SCHENKEL 1940, STRAND 1916, ZIER 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Bemerkung:** GRIMM 1985 wertet *D. cupreus* als Form von *D. lapidosus*. ROBERTS 1985, MAURER & HÄNGGI 1990 hingegen behandeln sie als valide Art. Zur Differenzierung vgl. ROBERTS 1985.

*Drassodes pubescens* (THORELL, 1856)

BAEHR & BAEHR 1984, GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Echemus angustifrons* (WESTRING, 1862)

BÖSENBERG 1903 (*Echemus rhenanus*)

*Gnaphosa bicolor* (HAHN, 1833)

GRIMM 1985, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER & DICK 1992

*Gnaphosa lucifuga* (WALCKENAER, 1802)

BÖSENBERG 1903, GRIMM 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, REIMOSER 1937a, STRAND 1907a

*Gnaphosa lugubris* (C. L. KOCH, 1839)

GRIMM 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Gnaphosa montana* (L. KOCH, 1866)

Coll. HARMS

*Gnaphosa nigerrima* L. KOCH, 1877

BAUER 1982, GRIMM 1985, RENNER & DICK 1992, WUNDERLICH 1973c, ZIER 1985

*Haplodrassus cognatus* (WESTRING, 1862)

LEIST 1978 (*Haplodrassus capnodes*), REIMOSER 1937a (*Haplodrassus capnodes*)

*Haplodrassus dalmatinus* (L. KOCH, 1866)

GRIMM 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987

*Haplodrassus kulczynskii* LOHMANDER, 1942

BÖSENBERG 1903 (*Drassus microps* und *Drassus minor* (Weibchen)), BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima kulczynskii*), GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977 (*Haplodrassus microps*), REIMOSER 1937a (*Haplodrassus microps*), WIEHLE 1965

*Haplodrassus minor* (O. P.-CAMBRIDGE, 1879)

HANDKE & SCHREIBER 1985, Coll. NÄHRIG

*Haplodrassus signifer* (C. L. KOCH, 1839)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Drassus troglodytes*), GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Drassodes troglodytes*), REIMOSER 1937a, STADLER & SCHENKEL 1940 (*Drassodes signifer*)

*Haplodrassus silvestris* (BLACKWALL, 1833)

BAEHR 1983a, DUMPERT & PLATEN 1985, GRIMM 1985, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985 (*Drassodes silvestris*), MISIOCH 1977, REIMOSER 1937a

*Haplodrassus soerensenii* (STRAND, 1900)

BAUCHHENSS 1988, Coll. ROSE

*Haplodrassus umbratilis* (L. KOCH, 1866)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Drassus umbratilis*), GRIMM 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987

*Micaria formicaria* (SUNDEVALL, 1832)

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WUNDERLICH 1979

*Micaria fulgens* (WALCKENAER, 1802)

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, WUNDERLICH 1979

*Micaria guttulata* (C. L. KOCH, 1839)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, HEUBLEIN 1983, REIMOSER 1937b

*Micaria pulicaria* (SUNDEVALL, 1832)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Micaria similis*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, REIMOSER 1937b, WUNDERLICH 1979, ZIER 1985

*Micaria silesiaca* L. KOCH, 1875

BÖSENBERG 1903, WUNDERLICH 1979

*Micaria subopaca* WESTRING, 1861

HARMS 1966, WUNDERLICH 1979, Coll. NÄHRIG

***Phaeocedus braccatus* (L. KOCH, 1866)**

GRIMM 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988

***Scotophaeus quadripunctatus* (LINNAEUS, 1758)**

BÖSENBERG 1903 (*Drassus quadripunctatus*), GRIMM 1985, REIMOSER 1937a

***Scotophaeus scutulatus* (L. KOCH, 1866)**

BÖSENBERG 1903, BÖSENBERG 1903 (*Drassus Voigtii*), GRIMM 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, REIMOSER 1937a, STRAND 1907a

***Sosticus lorictatus* (L. KOCH, 1866)**

GRIMM 1985

***Zelotes aeneus* (SIMON, 1878)**

BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima longipes*), GRIMM 1985, Coll. NÄHRIG

***Zelotes apricorum* (L. KOCH, 1876)**

BAEHR 1983a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1985, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987

***Zelotes atrocaeruleus* (SIMON, 1878)**

BAEHR & BAEHR 1984, GRIMM 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988

***Zelotes cliviculus* (L. KOCH, 1870)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima cliviculus*), GRIMM 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, REIMOSER 1937a

***Zelotes electus* (C. L. KOCH, 1839)**

GRIMM 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, REIMOSER 1937a

***Zelotes erebeus* (THORELL, 1870)**

GRIMM 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima cf. vespertina*), STADLER & SCHENKEL 1940

***Zelotes exiguis* (MÜLLER & SCHENKEL, 1895)**

BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima electa*), GRIMM 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, REIMOSER 1937a

***Zelotes latreillei* (SIMON, 1878)**

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima atra*), GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HARMS 1966 (*Zelotes ater*), HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima latreillei*), REIMOSER 1937a, ZIER 1985

***Zelotes longipes* (L. KOCH, 1866)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima serotina*), GRIMM 1985, REIMOSER 1937a

***Zelotes lutetianus* (L. KOCH, 1866)**

BAEHR 1983a, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima lutetiana*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1985, HOFFMANN 1980, REIMOSER 1937a

***Zelotes pedestris* (C. L. KOCH, 1837)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, (*Prosthesima pedestris*), GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Zelotes pedestris*), HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima pedestris*), REIMOSER 1937a, STRAND 1916 (*Prosthesima pedestris*)

***Zelotes petrensis* (C. L. KOCH, 1839)**

BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima petrensis*)

***Zelotes praeficus* (L. KOCH, 1866)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima praefica*), GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima latitans*), REIMOSER 1937a, SCHENKEL 1918 (*Prosthesima praefica*), STRAND 1916 (*Prosthesima praefica*)

***Zelotes pumilus* (C. L. KOCH, 1839)**

BÖSENBERG 1903, GRIMM 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima vernalis*), REIMOSER 1937a

***Zelotes pusillus* (C. L. KOCH, 1833)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima pusilla*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima pusilla*), REIMOSER 1937a

***Zelotes subterraneus* (C. L. KOCH, 1833)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, GRIMM 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1980, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima petiverii*)

***Zelotes villicus* (THORELL, 1875)**

BÖSENBERG 1903 (*Prosthesima accepta*), HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Prosthesima fusco-micans* "Weibch."), REIMOSER 1937a

## FAMILIE ZORIDAE

***Zora nemoralis* (BLACKWALL, 1861)**

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DAHL & DAHL 1927, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Zora parallela* SIMON 1878**

Coll. HARMS

***Zora silvestris* KULCZYNSKI, 1897**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, ZIER 1985

***Zora spinimana* (SUNDEVALL, 1833)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1984, DAHL & DAHL 1927, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HARMS 1978, HEUBLEIN 1983, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a, ZIER 1985

## FAMILIE HETEROPODIDAE

### RIESENKRABBENSPINNEN

***Micrommata virescens* (CLERCK, 1757)**

BELLMANN 1984, HAFNER 1991, HARMS 1966 (*Micrommata rosea*), HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Micrommata rosea*), LEIST 1978 (*Micrommata rosea*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Micrommata omata*), STRAND 1907a (*Micrommata viridissima*)

# FAMILIE PHILODROMIDAE LAUFSPINNEN

*Philodromus albidus* KULCZYNSKI, 1911

Coll. HARMS

*Philodromus aureolus* (CLERCK, 1757)

BAEHR 1983a, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Philodromus buxi* SIMON, 1884

NÄHRIG 1987, Coll. HARMS

**Synonym:** *Philodromus albomaculatus*

*Philodromus cespitum* (WALCKENAER, 1802)

BAEHR 1983a (*Philodromus aureolus caespiticollis*), BÖSENBERG 1903 (*Philodromus reussi*), DETTNER 1985 (*Philodromus reussi*), DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Philodromus collinus* C. L. KOCH, 1835

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Philodromus corticinus* (C. L. KOCH, 1837)

Coll. HARMS

*Philodromus dispar* WALCKENAER, 1825

HEUBLEIN 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1916

*Philodromus emarginatus* (SCHRANK, 1803)

BÖSENBERG 1903 (*Artanes emarginatus*), LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Philodromus cf. lineatipes*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925

*Philodromus fuscomarginatus* (DE GEER, 1778)

BAEHR 1983a, HARMS 1966 (*Philodromus cf. fuscomarginatus*), WUNDERLICH 1982

*Philodromus margaritatus* (CLERCK, 1757)

DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895,

*Philodromus poecilus* (THORELL, 1872)

BÖSENBERG 1903 (*Artanes poecilus*), LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Philodromus cf. poecilus*)

*Philodromus praedatus* O. P.-CAMBRIDGE, 1871

WOLF & ZIMMERMANN 1991, Coll. KIECHLE, Coll. NÄHRIG

*Philodromus rufus* (WALCKENAER, 1825)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Thanatus arenarius* THORELL, 1872

BÖSENBERG 1903, Coll. HARMS

*Thanatus formicinus* (CLERCK, 1757)

BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, HEUBLEIN 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Thanatus sabulosus* (MENGE, 1875)

BÖSENBERG 1903 (*Philodromus sabulosus*), HARMS 1966

*Thanatus striatus* C. L. KOCH, 1845

HARMS 1987, HOFFMANN 1980, LEIST 1978

*Thanatus vulgaris* SIMON, 1870

KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988

*Tibellus maritimus* (MENGE, 1875)

HARMS 1987, HOFFMANN 1980, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER & DICK 1992

*Tibellus oblongus* (WALCKENAER, 1802)

HARMS 1987, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Philodromus oblongus*), LEIST 1978,

MÜLLER & SCHENKEL 1895, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tibellus propinquus*), NÄHRIG

1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

## FAMILIE THOMISIDAE

### KRABBENSPINNEN

*Coriarachne depressa* (C. L. KOCH, 1837)

DETTNER 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Dlaea dorsata* (FABRICIUS, 1777)

BELLMANN 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, HAFNER 1991, HARMS 1966, HÖFER 1989,  
LEIST 1978, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918,  
SCHENKEL 1925, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Heriaeus mellottel* SIMON, 1886

HARMS 1987 (*Heriaeus hirtus*), HEUBLEIN 1983 (*Heriaeus oblongus*), LEIST 1978 (*Heriaeus hirsutus*), LOERBROKS 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Heriaeus hirsutus*)

*Misumena vatia* (CLERCK, 1757)

BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, GÜNZL 1989, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST  
1978, LITZELMANN 1929 (*Misumena calycina*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987,  
STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Misumenops tricuspidatus* (FABRICIUS, 1775)

LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

*Oxyptila atomaria* (PANZER, 1801)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Oxyptila horticola*), BRAUN 1956, GACK &  
KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983,  
KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER &  
SCHENKEL 1895 (*Oxyptila horticola*), STRAND 1916 (*Oxyptila horticola*)

*Oxyptila blackwalli* SIMON, 1851

HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Oxyptila brevipes* (HAHN, 1826)

BÖSENBERG 1903 (Weibchen sub *O. rubicunda*, HARMS mündl. Mitt.), MÜLLER & SCHEN-  
KEL 1895, SCHENKEL 1918

*Oxyptila gertschi* (KURATA, 1944)

HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c

*Oxyptila nigrita* (THORELL, 1875)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, KOBEL-  
LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Oxyptila praticola* (C. L. KOCH, 1837)

GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HÖFER 1989, KOBEL-  
LAMPARSKI 1987, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, RENNER &  
TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1918

***Oxyptila pullata* (THORELL, 1875)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, WIEHLE 1965

**Synonym: *Oxyptila kotulai***

***Oxyptila rauda* SIMON, 1875**

BÖSENBERG 1903, MÜLLER & SCHENKEL 1895, Coll. HARMS

***Oxyptila sanctuaria* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)**

BÖSENBERG 1903 (sub Weibchen *Oxyptila brevipes*, HARMS mündl. Mitt.)

***Oxyptila scabricula* (WESTRING, 1851)**

BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Oxyptila simplex* (O. P.-CAMBRIDGE, 1862)**

BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966

***Oxyptila trux* (BLACKWALL, 1846)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WUNDERLICH 1973c, ZIER 1985

***Pistius truncatus* (PALLAS, 1772)**

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940, STRAND 1907a

***Synaema globosum* (FABRICIUS, 1775)**

BÖSENBERG 1903, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940

***Thomisus onustus* WALCKENAER, 1806**

BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, NÄHRIG 1987

***Tmarus piger* (WALCKENAER, 1802)**

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Xysticus acerbus* THORELL, 1872**

BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987

***Xysticus albomaculatus* KULCZYNSKI, 1891**

WUNDERLICH 1982

***Xysticus audax* (SCHRANK, 1803)**

HAFNER 1991, HÖFER 1989, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Xysticus pini*), NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Xysticus bifasciatus* C. L. KOCH, 1837**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Xysticus cambridgei* (BLACKWALL, 1858)**

MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Xysticus luctator*), Coll. KIECHLE, Coll. ROSE

***Xysticus cristatus* (CLERCK, 1757)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, SCHMID 1967, STRAND 1907a, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Xysticus erraticus* (BLACKWALL, 1834)

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Xysticus kempeleni* THORELL, 1872

de LESSERT 1910, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, WOLF & ZIMMERMANN 1991

*Xysticus kochi* THORELL, 1872

BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Xysticus lanlo* C. L. KOCH, 1835

BAEHR 1983a, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, STADLER & SCHENKEL 1940

*Xysticus lineatus* (WESTRING 1851)

GACK & KOBEL-VOSS 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Xysticus dentiger*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, WUNDERLICH 1973c

*Xysticus luctuosus* (BLACKWALL, 1836)

BÖSENBERG 1903, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Xysticus robustus* (HAHN, 1832)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, BÖSENBERG 1903 (*Xysticus fucatus*), HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Xysticus sabulosus* (HAHN, 1832)

Coll. HARMS, Coll. LEIST

*Xysticus ulmi* (HAHN, 1831)

BAEHR 1983a, BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

## FAMILIE SALTICIDAE

### SPRINGSPINNEN

*Ballus chalybeius* (WALCKENAER, 1802)

GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 (*Ballus depressus*)

*Ballus rufipes* (SIMON, 1868)

Coll. HARMS

*Blanor aurocinctus* (OHLERT, 1865)

BAEHR & BAEHR 1984 (*Blanor aenescens*), BAUER 1982, CASEMIR 1961, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Ballus aenescens*)

*Carrihotus xanthogramma* (LATREILLE, 1819)

BÖSENBERG 1903 (*Phlaeaeus bicolor*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Phlaeaeus bicolor*)

**Bemerkung:** vgl. TÖPFER-HOFMANN & FISCHER 1991

**Dendryphantes rufus** (SUNDEVALL, 1832)

HARMS 1966, HÖFER 1989, STRAND 1907a, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Dendryphantes bombyclus*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Euophrys aperta** MILLER, 1971

KOBEL-LAMPARSKI 1987, COLL. KIECHLE, COLL. WUNDERLICH

**Euophrys aequipes** (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Euophrys erratica** (WALCKENAER, 1826)

HARMS 1966 (*Pseudophrys callida*), MÜLLER & SCHENKEL 1895

**Euophrys frontalis** (WALCKENAER, 1802)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Euophrys maculata*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Euophrys herbigrada** (SIMON, 1871)

WOLF & ZIMMERMANN 1991, COLL. NÄHRIG

**Euophrys lanigera** (SIMON, 1871)

HARMS 1966, HÖFER 1989, MISIOCH 1977, WIEHLE 1967, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Euophrys petrensis** C. L. KOCH, 1837

BAEHR 1983a

**Euophrys westringi** (SIMON, 1868)

WUNDERLICH 1975 (*Euophrys ?westringi*)

**Evarcha arcuata** (CLERCK, 1757)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1980, BELLMANN 1984, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978 (*Evarcha marcgravi*), MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Hasarius arcuatus*), NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985

**Evarcha falcata** (CLERCK, 1757)

BAEHR 1983a, DETTNER 1985, HAFNER 1991, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977 (*Evarcha flammata*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Hasarius falcatus*), SCHENKEL 1925

**Evarcha laeta**bunda**** (C. L. KOCH, 1848)

MISIOCH 1977, COLL. HARMS

**Heliophanus aeneus** (HAHN, 1831)

BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARM 1971, HARMS 1966, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WESOLOWSKA 1986, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Synonym:** *Heliophanus muscorum*

**Heliophanus auratus** C. L. KOCH, 1835

BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARM 1971, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WESOLOWSKA 1986

**Heliophanus cupreus** (WALCKENAER, 1802)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Heliophanus metallicus*), NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

- Heliophanus dampfi* SCHENKEL, 1923  
 HARM 1971, HOFFMANN 1980, SCHENKEL 1925, WESOLOWSKA 1986
- Heliophanus dubius* C. L. KOCH, 1835  
 HARM 1971, HARMS 1966, LEIST 1978,
- Heliophanus flavipes* HAHN, 1823  
 HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Heliophanus ritteri*), HEUBLEIN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1918, WESOLOWSKA 1986, WOLF & ZIMMERMANN 1991
- Heliophanus patagatus* THORELL, 1875  
 de LESSERT 1910
- Heliophanus tribulosus* SIMON, 1868  
 MÜLLER & SCHENKEL 1895, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Heliophanus cambridgei*), Coll. HARMS
- Leptorchestes berolinensis* (C. L. KOCH, 1846)  
 MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1967
- Marpissa muscosa* (CLERCK, 1757)  
 HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895
- Marpissa pomata* (WALCKENAER, 1802)  
 HARM 1981, MÜLLER & SCHENKEL 1895, Coll. von HELVERSEN, Coll. WUNDERLICH
- Marpissa radiata* (GRUBE, 1859)  
 HARM 1981, Coll. von HELVERSEN
- Myrmarachne formicaria* (DE GEER, 1778)  
 BAUER 1982, DAHL 1926, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1967
- Synonym:** *Myrmarachne joblotti*
- Neaetha membra* (SIMON, 1868)  
 Coll. von HELVERSEN
- Neon laevis* (SIMON, 1871)  
 WIEHLE 1967, Coll. HARMS
- Neon rayi* (SIMON, 1875)  
 WIEHLE 1967, Coll. HARMS
- Neon reticulatus* (BLACKWALL, 1853)  
 BAEHR 1983a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985
- Neon valentulus* FALCONER, 1912  
 BAUER 1982, HOFFMANN 1980, ZIER 1985
- Pellenes arcigerus* (WALCKENAER, 1837)  
 Coll. BELLMANN, Coll. von HELVERSEN
- Pellenes nigrociliatus* (L. KOCH, 1875)  
 HORN 1980, Coll. BELLMANN
- Pellenes tripunctatus* (WALCKENAER, 1802)  
 BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991
- Phlaeaeus chrysops* (PODA, 1761)  
 BELLMANN 1984, BRAUN 1966, LEIST 1970, MÜLLER & SCHENKEL 1895
- Phlegra fasciata* (HAHN, 1826)  
 DAHL 1926, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977

**Phlegra festiva** (C. L. KOCH, 1834)

BÖSENBERG 1903 (*Aelurillus festivus*), HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Aelurops festivus*)

**Phlegra v-Insignita** (CLERCK, 1757),

BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966 (*Aelurillus litera-v-insignitus*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KLEIBER 1911 (*Aelurillus insignitus*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Aelurops v-insignitus*)

**Bemerkung:** In HEIMER & NENTWIG 1991 werden unter *Aelurillus v-insignitus* 2 unterscheidbare Formen ("schwarze Form" und "graue Form") beschrieben.

**Pseudicius encarpatus** (WALCKENAER, 1802)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966

**Salicus cingulatus** (PANZER, 1797)

MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Epiblemmum cingulatum*), NÄHRIG 1990, Coll. HARMS

**Bemerkung:** In der Sammlung SCHENKEL im NHB befindet sich nur ein adulter Männchen aus Langenbruck (Schweizer Jura). Bei allen übrigen handelt es sich um subadulte Individuen (HÄNGGI pers. Mitt.) vgl. auch MÜLLER & SCHENKEL 1895: 809.

**Salicus scenicus** (CLERCK, 1757)

BELLMANN 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Epiblemmum scenicum*), STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Salicus zebraneus** (C. L. KOCH, 1837)

HARMS 1966 (*Salicus olearii*), LEIST 1978 (*Salicus olearii*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Epiblemmum zebraneum*), NÄHRIG 1987 (*Salicus olearii*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

**Sitticus carlicis** (WESTRING, 1861)

BAUER 1982, HOFFMANN 1980, LEIST 1978

**Sitticus distinguendus** (SIMON, 1868)

Coll. HARMS

**Sitticus floricola** (C. L. KOCH, 1837)

GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Sitticus littoralis*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Attus floricola*), Coll. HARMS

**Sitticus penicillatus** (SIMON, 1875)

HARM 1973 (*Sitticus penicillatus*), HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Attus penicillatus*)

**Sitticus pubescens** (FABRICIUS, 1775)

DAHL 1926 (*Sitticus truncorum*), HARM 1973, HARMS 1966 (*Sitticus truncorum*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Attus pubescens*), STRAND 1907a

**Sitticus saltator** (SIMON, 1868)

Coll. von HELVERSEN

**Sitticus zimmermanni** (SIMON, 1877)

KOBEL-LAMPARSKI 1987

**Synageles hilarulus** (C. L. KOCH, 1846)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, WIEHLE 1967, ZIER 1985

**Synageles venator** (LUCAS, 1836)

BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

## AUSWERTUNG

Der Literatur-Auswertung liegen insgesamt 6110 Fundmeldungen zugrunde. Diesen Meldungen konnten Fundorte aus 129 Meßtischblättern der Topographischen Karte 1 : 25 000 (TK25) zugeordnet werden. 365 Zitate, die 266 Arten einschließen, konnten nicht lokalisiert werden. Baden-Württemberg umfaßt 307 Meßtischblätter (TK25), wobei einige davon allerdings nur teilweise baden-württembergisches Territorium betreffen. Somit sind nur von 42 % aller TK25 Spinnenfunde belegt (Abb. 1). Auf den meisten davon sind weniger als 10 Arten nachgewiesen (Tab. 1).


Tab. 1 Anzahl der Meldungen und Artenzahl für die 129 genannten TK25 in Baden-Württemberg.

Anzahl TK25	Anteil in %	Artenzahl
80	62	0 - 10
27	21	11 - 50
9	7	51 - 100
9	7	101 - 200
4	3	über 200

Die meisten Arten sind vom Kartenblatt 7420 (Tübingen) gemeldet. Hier sind 369 Arten durch 571 Zitate belegt. Es folgen die Kartenblätter 7911 (Breisach - mit Kaiserstuhlgebiet, 280 Arten, 625 Zitate), 8411 (Weil am Rhein, 234 Arten / 252 Zitate) und 8311 (Lörrach, 215 Arten / 338 Zitate). Das Blatt Lörrach umfaßt die Region Basel, die Zitate repräsentieren hauptsächlich die Sammelergebnisse von MÜLLER & SCHENKEL (1895).

Lediglich bei jenen TK25, auf denen mehr als 100 Arten nachgewiesen sind, kann der Kenntnisstand als zufriedenstellend bezeichnet werden. Der Bearbeitungsstand eines Kartenblattes spiegelt sich nicht nur in der Artenzahl, sondern ebenso in der Anzahl der Zitate und Arbeiten, die das jeweilige Kartenblatt betreffen, wieder. So beruhen die 571 Zitate mit 369 Arten aus dem Kartenblatt 7420 (Tübingen) auf 18 Arbeiten, die Zahlen aus dem Blatt 7911 (Breisach) auf 24 Arbeiten. Auf 88 Kartenblättern (68 %) entspricht die Anzahl der Zitate der Anzahl der Arten. Hier berichtet ein Autor meist von einem Einzelfund oder einer einzelnen Aufsammlung in einem bestimmten Gebiet. Die Artenzahlen liegen dabei - bis auf wenige Ausnahme - meist unter 50. Auf einigen Kartenblättern sind vergleichsweise wenige Arten durch eine große Anzahl von Zitaten belegt. Dies deutet

Abb. 1: Anzahl der in der Literatur nachgewiesenen Arten pro Kartenblatt der Topographischen Karten 1 : 25 000.



Kartographie und Druck: Landesvermessungsamt Baden - Württemberg 1983

darauf hin, daß hier intensiv nach bestimmten Arten gesucht wurde. So liegen z.B. vom Blatt 6617 (Schwetzingen) 72 Meldungen vor, von denen sich 69 auf die vier dort vorkommenden *Cheiracanthium*-Arten beziehen (WOLF 1989). Als Einzelfunde sind nur 3 weitere Arten aus diesem Bereich gemeldet (LAUTERBORN 1922, GRIMM 1985).

Diese vorläufige Auswertung verdeutlicht, daß trotz zahlreicher Literaturzitate der Kenntnisstand über die Verbreitung der Spinnen in Baden-Württemberg als mangelhaft bezeichnet werden muß.

## ANHANG

### 1. Nicht mehr belegbare Arten

Folgende Arten wurden als Einzelfunde in der Literatur genannt, Belegmaterial ist nicht mehr verfügbar.

*Acantholycosa lignaria* (CLERCK, 1757)

*Alopecosa pinetorum* (THORELL, 1856)

*Amaurobius pallidus* L. KOCH, 1868 (vgl. WIEHLE 1953: 129 ff.)

*Drassodes hypocrita* (SIMON, 1878)

*Erigone capra* SIMON, 1884

*Euophrys milleri* BRIGNOLI 1983 (= *Euophrys brevipes*)

*Lepthyphantes* sp. (fig. 15) MÜLLER & SCHENKEL 1895

*Xysticus gallicus* SIMON, 1875

*Xysticus viduus* KULCZYNSKI, 1898

*Zelotes rusticus* (L. KOCH, 1872)

### 2. "Bösenberg - Arten"

Das Typusmaterial der folgenden Arten übergab BÖSENBERG zusammen mit seiner kompletten Sammlung dem Stuttgarter Naturalienkabinett. Diese Sammlung wurde 1944 zerstört (RENNER 1988, 1991).

*Centromerus obscurus* BÖSENBERG, 1902

BRAUN 1982 wertet *C. obscurus* als Synonym vom "? *Centromerus brevipalpus*" = *C. aequalis*. THALER 1983 meldet den Fund eines "rätselhaften Weibchens aus dem Burgenland", dessen Epigyne eine auffällige Ähnlichkeit zu *Centromerus obscurus* zeigt und folgert "vielleicht ist *C. obscurus* doch eine valide "xerotherme" Art des südöstlichen Europa". THALER & HÖFER 1988 werten *C. obscurus* als Synonym von *C. capucinus*. HARMS (mündl. Mitt.) verweist auf die Beschreibung von BÖSENBERG (1903, Seite 137: "alle Knäue haben an der Hinterseite eine Verdickung") und stellt die Frage, ob *Centromerus obscurus* überhaupt eine *Centromerus*-Art ist. Er schlägt vor zu prüfen, ob *Centromerus obscurus* vielleicht *Lasiargus hirsutus* sein könne, der die Patellenverdickung besitzt und eine *Centromerus*-ähnliche Epigyne hat.

*Gonatium fuscum* (BÖSENBERG, 1902)

BRAUN 1982 deutet die Art als Synonym von "? *Walckenaeria cornicularis*".

**Gonatium gibbum** (BÖSENBERG, 1902)

BRAUN 1982 wertet die Art als Synonym von "? *Entelecara media*"

**Gonatium pallidum** (BÖSENBERG, 1902)

BRAUN 1982 wertet die Art als Synonym von "? *Gongylidium rufipes*".

**Lophocarenum affine** BÖSENBERG, 1902

Nach ROEWER 1954 nicht zu deuten.

**Lophomma albipes** (BÖSENBERG, 1902)

Wird von BRAUN 1982 als Synonym von *Leptyphantes nitidus* gedeutet.

**Lophomma rufipes** BÖSENBERG, 1902

Die Art ist nach BRAUN 1982 nicht zu deuten.

**Oedothorax tenerum** (BÖSENBERG, 1902)

sub *Kulczynskielum tenerum*. Die Art ist nicht zu deuten (vgl. BRAUN 1982).

**Pardosa annae** (STRAND, 1916)

*Pardosa annae* wurde von BÖSENBERG 1903 als *P. turva* beschrieben und von STRAND 1916 in *P. annae* umbenannt; diese wird von BRAUN 1982 als mögliches Synonym von *Pardosa amentata* gedeutet.

**Pardosa Intermedia** (BÖSENBERG, 1903)

Wird von BRAUN 1982 als Synonym von *Pardosa palustris* gedeutet.

**Sitticus exiguus** (BÖSENBERG, 1903)

**Xysticus concinnus** BÖSENBERG, 1902

### 3. Synanthrope bzw. eingeschleppte Arten

**Acanthoctenus spinipes** KEYSERLING, 1876

SCHMIDT in litt.

**Cataphrithorax plumosus** (EMERETON, 1882)

SCHÄFER 1966

**Cicurina japonica** (SIMON, 1886)

Coll. WUNDERLICH

**Cuplennius exterritorialis** (STRAND, 1909)

SCHMIDT in litt.

**Cuplennius getazi** SIMON 1891

SCHMIDT in litt.

**Cuplennius salei** (KEYSERLING 1876)

SCHMIDT in litt.

**Hasarius adansonii** (AUDOUIN, 1826)

Coll. STUMPF, SCHMIDT in litt.

**Heteropoda venatoria** (LINNAEUS, 1767)

SCHMIDT in litt.

**Loxosceles rufescens** (DUFOUR, 1820)

Coll. ROSE

**Ollus antiquensis** (KEYSERLING, 1880)

SCHMIDT in litt.

**Psecas rubrostriatus** SCHMIDT, 1956

SCHMIDT in litt.

**Phoneutria boliviensis** (F. O.-CAMBRIDGE, 1897)

SCHMIDT in litt.

**Phoneutria keyserlingi** (F. O.-CAMBRIDGE, 1897)

SCHMIDT in litt.

## LITERATUR

Hier sind nur Arbeiten angeführt, die nicht in der Bibliographie der Spinnen Baden-Württembergs (RENNER 1992) genannt sind.

- BOSMANS, R. (1988): On the identity of *Zodarion italicum* (CANESTRINI, 1868) and *Zodarion gallicum* SIMON, 1873. - Newsl. Br. arachnol. Soc. 53: 4-5
- BRAUN, R. & W. RABELER (1969): Zur Autökologie und Phänologie der Spinnenfauna des nordwestdeutschen Altmoränen-Gebietes. - Abh. senckenberg. naturforsch. Ges. 522: 1-89
- BRAUN, R. (1982): Deutung der angeblich neuen 'Deutschland'-Arten BÖSENBERGS und ihrer balkanischen 'Wiederfunde' (Arachnida: Araneida). - Senckenbergiana biol. 62: 355-384
- CORDES, D. & O. v. HELVERSEN (1990): Indications for the existance of *Alopecosa barbipes* (SUNDEVALL 1832) as a 'sibling species' to *Alopecosa accentuata* (LATREILLE 1817). - Results of morphological, ethological and biogeographical studies. - Bull. soc. europ. Arachnol. 1: 70-74
- HEIMER, S. & W. NENTWIG (1991): Spinnen Miteuropas. Parey, Berlin u. Hamburg. 543 S.
- KRONESTEDT, T. (1990): Separation of two species standing as *Alopecosa aculeata* (CLERCK) by morphological, behavioural and ecological characters, with remarks on related species in the *pulverulenta* group (Araneae, Lycosidae). - Zool. Scr. 19: 203-225
- KRONESTEDT, T. (1992): The identity of *Pardosa alacris* (C. L. KOCH 1833) (Arachnida: Araneae: Lycosidae). - Senckenbergiana biol. 72: 179-182
- MAURER, R. & A. HÄNGGI (1990): Katalog der schweizerischen Spinnen. - Doc. Faun. Helvet. 12: ohne Paginierung. CSCF, Neuchâtel.
- MERRITT, P. & A. F. MILLIDGE (1992): Amendments to the checklist of British spiders. - Bull. Br. arachnol. Soc. 9: 4-9
- RENNER, F. (1988): Liste der im Krieg vernichteten Typen des Königlichen Naturalienkabinetts in Stuttgart. - TUB-Dokumentation Kongresse Tagungen 38: 319-329
- RENNER, F. (1991): Die Spinnensammlung von Wilhelm Bösenberg. - Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. C 30: 43-46
- RENNER, F. (1992): Liste der Spinnen Baden-Württembergs (Araneae). Teil 1: Bibliographie und Liste der Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae. - Arachnol. Mitt. 3: 14-53
- ROBERTS, M. J. (1985): The spiders of Great Britain and Ireland. Vol. 1. Atypidae to Theridiosomatidae. Harley Books, Colchester. 229 S.
- TONGIORGI, P. (1966a): Italian wolf spiders of the genus *Pardosa* (Araneae: Lycosidae). - Bull. Mus. Comp. Zool. 134: 275-334
- TONGIORGI, P. (1966b): Wolf spiders of the *Pardosa monticola*-group (Araneae: Lycosidae). - Bull. Mus. Comp. Zool. 134: 335-359
- TÖPER-HOFMANN, G. & O. v. HELVERSEN (1990): Four species of the *Pardosa lugubris*-group in Central Europe (Araneae, Lycosidae). - A preliminary report. - Bull. soc. europ. Arachnol. 1: 349-352

Franz Renner, Sonnentaustraße 3, D-W-7954 Bad Wurzach